

Conjunto Tecnológico para la Producción de Pimiento¹

MALEZAS²

Dra. María de L. Lugo³

El control de malezas en el cultivo de pimiento es una práctica necesaria. De no realizarse, se reducirá el rendimiento y la calidad del producto, lo que redundará en pérdidas económicas. Las malezas compiten con el pimiento principalmente por agua, nutrientes y luz; además, son hospederas de plagas y enfermedades. La reducción en rendimiento a causa de las malezas dependerá de las especies presentes, de la densidad poblacional de éstas y de la etapa en el ciclo del cultivo en que interfieren con el mismo. El período crítico de competencia de las malezas se extiende desde el trasplante hasta cinco semanas después.

Las especies de gramíneas más comunes presentes en la zona sur de la isla, donde se concentra la mayor producción del pimiento, son arrocillo (*Echinochloa colona*), pata de gallina (*Eleusine indica*), pata de gallina fina (*Digitaria sanguinalis*) y yerba de hilo (*Leptochloa filiformis*). Entre las especies de hoja ancha están el bleo (*Amaranthus dubius*), belladona del pobre (*Datura stramonium*), cardo santo (*Argemone mexicana*), peseta (*Thrianthema portulacastrum*), platanito (*Cleome gynandra*) y verdolaga (*Portulaca oleracea*). El coquí (*Cyperus rotundus*) también es muy común, éste pertenece a las Cyperaceas. Para mayor información y fotografías de éstas y otras malezas, vea la publicación *Guía para el reconocimiento de malezas comunes en zonas agrícolas de Puerto Rico* de la Estación Experimental Agrícola.

En pimiento se han establecido densidades de daño económico para algunas especies de malezas: peseta – 20 plantas/m², arrocillo - 10 plantas/m² y bleo - 2 plantas/m². Densidades de malezas mayores a éstas resultarán en una disminución en el rendimiento del cultivo y por tanto en pérdidas económicas.

El manejo de las malezas a través del año en los predios donde se planifica sembrar pimiento es la alternativa más adecuada para reducir el problema de la competencia de las malezas con el cultivo. El primer paso del manejo consiste en incorporar al suelo los residuos del cultivo anterior y las malezas existentes en el predio mediante un arado profundo. El segundo paso consiste en mantener el suelo libre de malezas durante el periodo entre cultivos, lo que se puede lograr con una combinación de prácticas: a) incorporar las malezas recién brotadas con un pase de rastra (la frecuencia de esta práctica dependerá del tipo de malezas, el tipo de suelo y la

¹ Derechos Reservados. La Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico retiene todos los derechos sobre este documento. Se permite el uso o la reproducción parcial del mismo para usos educativos, siempre y cuando se dé crédito total a la EEA/UPR, citando la publicación, la fuente, la fecha de publicación y el autor del capítulo utilizado.

² Este documento es uno de los capítulos que componen el *Conjunto Tecnológico para la Producción de Pimiento: Tipos 'cubanelle' y 'campana'* (Publicación 164. Junio 2005).

³ Investigadora, Departamento de Protección de Cultivos, Estación Experimental Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico.

cantidad de lluvia) y b) aplicación de herbicidas de tipo sistémico (que se translocan) o de herbicidas de contacto. El agricultor debe tomar en consideración el costo de estas prácticas.

Un buen manejo del predio a ser sembrado resultará en una reducción notable en la competencia de las malezas con el cultivo después de la siembra de éste. Luego de preparar el terreno para sembrar, preparar los bancos, y colocar las líneas de riego, se coloca la cubierta plástica. Cuando se utiliza la cubierta plástica usualmente no se utilizan herbicidas preemergentes o pre-siembra incorporados. Las malezas entre los bancos se controlan ya sea con cultivo mecánico, con la aspersión de herbicidas de contacto aplicados con campana y dirigidos a las malezas, o por medio de una combinación de estos métodos. Dos herbicidas posemergentes en uso son paraquat y glifosato. Existen en el mercado, y con permiso de uso en Puerto Rico, varios herbicidas que son eficientes en el combate del coquí, gramíneas y malezas de hoja ancha. Consulte un agente agrícola del Servicio de Extensión Agrícola para decidir el herbicida a aplicar.

Aunque la mayor parte del pimiento se produce en la zona sur del país, también se produce en otras regiones de la isla donde comúnmente se utiliza el método de trasplante sin el uso de la cubierta plástica; en estos casos se depende del control manual de malezas y el uso de herbicidas. En el caso de los herbicidas preemergentes, éstos se aplican al suelo después de preparar los bancos. Estos son efectivos contra las malezas antes de que éstas emerjan.

Al seleccionar herbicidas hay que considerar factores de la planta, suelo y condiciones ambientales. Las especies presentes determinan cuál herbicida se utilizará. Hay herbicidas que solo controlan malezas de hoja ancha o gramíneas y otros son de mayor espectro. El tamaño de la maleza determina la dosis a utilizarse; las plántulas generalmente son más fáciles de controlar que las plantas adultas. Debemos recordar que las plantas que crecen rápidamente generalmente son más susceptibles a los herbicidas posemergentes, ya que pueden translocar más rápido los herbicidas que aquellas de crecimiento más lento. El mejor momento de aplicar los herbicidas es cuando las malezas están en crecimiento activo.

Por otro lado, el tipo de suelo puede determinar la dosis de herbicida que se debe utilizar. En general, la dosis más baja se recomienda en suelos arenosos. El contenido de materia orgánica (MO) influye en la decisión del herbicida a escoger. La MO puede adsorber algunos herbicidas tal como lo adsorben las partículas de arcilla del suelo, también la MO puede inactivar algunos herbicidas. Cuando prepare su tanque para aspersión de herbicidas asegúrese que el agua que utiliza esté libre de partículas de suelo, por ejemplo, el paraquat pierde efectividad en agua con alto contenido de coloides del suelo. Para que los herbicidas preemergentes sean efectivos, es necesario que haya humedad en el suelo (lo ideal es 1/2" de agua). Los herbicidas posemergentes y los incorporados al suelo no la necesitan. Hay algunos herbicidas que se lixivian en suelos arenosos cuando ocurren fuertes lluvias. De igual manera hay herbicidas de uso posemergente que son afectados por la lluvia. La persistencia de los herbicidas también determina la selección de éstos. Algunos herbicidas tienen corta vida, mientras que otros persisten por más tiempo. Esto es muy importante a la hora de seleccionar cultivos de rotación. En el cultivo de pimiento hay registro de herbicidas presiembra incorporado, éstos hay que incorporarlos para evitar que se volatilicen o se descompongan por la luz solar. El comportamiento de los herbicidas se afecta por el viento, principalmente por el acarreo. El

acarreo puede causar daño a siembras cercanas y puede reducir el control de las malezas que queremos controlar.

Aunque no pretendemos cubrir todo lo relacionado al comportamiento de los herbicidas, no podemos ignorar el aspecto de calibración de equipo. Si se quiere un buen control de malezas, es importante que el equipo de aplicación (boquillas, cedazos, relojes de presión, etc.) esté en buen estado y que se haya calibrado el mismo, por ejemplo, si se va a utilizar un brazo ("boom") de 24 boquillas, éstas tienen que ser iguales. Finalmente, aplique los herbicidas solamente como se especifica en la etiqueta. La información contenida en la etiqueta es importante para el uso eficiente y seguro del producto.